高齢者の運動療法の認知機能に対する効果 —光学的脳機能計測法による認知機能評価—

日本中医学会学術総会シンポジウム
2014年9月13日

日本大学
工学部 次世代工学技術研究センター
医学部 脳神経外科
酒谷 薫

背景

● WHO reported that number of dementia in the world may increase to 65 million in 2030, and to 120 million in 2050.

Figure 1 The growth in numbers of people with dementia (in millions) in high income countries, and low and middle income countries

しかしながら、認知症に対する薬物療法の効果は限られている。

アルツハイマー治療薬開発の失敗

- ・ 米イーライリリー・アンド・カンパニーは、アルツハイマー型認知症治療薬候補として開発中の「semagacestat」の開発を中止(2012年): 2つの長期第III相臨床試験からの予備段階の結果において、疾患の進行の抑制が見られず、認知機能の臨床的スコアの悪化を伴い、また日常生活能力も低下させた。
- ・ ファイザーとジョンソン・エンド・ジョンソンは、アルツハイマー病治療薬、バピヌズマブ(bapineuzumab)の開発を取り止めると発表した(2012年)。治験で期待された効果がみられなかったため。
- ・ アストラゼネカは、アルツハイマー病治療薬の開発に成功すれば、最大で年間50億ドルの売り上げが見込まれる、と試算。しかしアルツハイマー病治療薬の開発は失敗する率が高いことから、アストラゼネカが開発に成功する確率はリスク調整ベースでわずか9%とされている。

高齢者のQOLを高める非薬物療法の研究が重要となる。

運動療法 (ISOTT2012)

アロマセラピー (ISOTT2011)

Neuro-feedback (ISOTT2012)

鍼灸 (ISOTT2014)

脳波

神経細胞の電気的活動を測定 (一次信号)

電位の増大による神経細胞から化学物質が放出され、情報が伝達される

欠点

- ① 電氣的ノイズに弱い
- ② 筋電図が混入
- ③ 電極装着時に良導体クリームを使用
- ④ 空間分解能が低い

光学的脳機能計測法 (NIRS) の原理

fMRI, PET

神経活動に伴う脳血流変化を測定
(二次信号)

(fMRI)

光学的計測法 NIRS

(Near infrared spectroscopy; 近赤外分光法)

NIRS装置開発の歴史

NIRSの基本原理(1)

可視光 (400~700nm)

近赤外光 (700~1000 nm)

NIRSの基本原理(2)

変形 Beer-Lambert 則

$$\Delta OD(\lambda) = \epsilon(\lambda) \cdot \Delta c \cdot d$$

- ϵ = モル吸光係数
- c = 吸光物質の濃度 (mmol / L)
- d = 光路長 (cm)

測定パラメータ

- Δ 酸化Hb (=脳血流)
- Δ 脱酸化Hb
- Δ 総Hb (=血液量)

NIRSによる脳機能計測

神経活動時の脳血流酸素代謝変化

運動機能のイメージング: BOLD-fMRIとNIRSの比較

NIRSとfMRIの比較

	NIRS	fMRI
測定方法	光	磁気
非侵襲的計測	可能	可能
リアルタイム計測	可能	困難
価格	安価	高価
装置サイズ	コンパクト	大型
測定時の拘束	少ない	大きい
測定場所	選ばない	限定

高齢者における運動療法のワーキングメモリーに対する効果

エクササイズは脳機能を向上させる(長期的効果)

図 運動頻度別に比較した認知症未発症者の割合 (Kaplan-Meier 曲線推定値) (Colcombe 2003)

有酸素運動を6か月続けると前頭前野の皮質と白質の容積が増大する(Colcombe et al. 2006)

高齢者における有酸素運動の大脳灰白質、白質の容積に対する影響

Colcombe SJ, et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2006

6か月間の有酸素運動(週3回1時間ウォーキング6か月)を行うと、コントロール(ストレッチ)よりも灰白質(青色)、白質(黄色)の容積が増大した。

動物実験: 運動により神経成長因子(BDNF)が増加

方法

高齢者14例 (平均年齢= 65.9 歳: 女性9例、男性5例)

◆ Exercise Condition

NIRS (5 min)	Exercise (10 min)	Rest (10 min)	NIRS (5 min)
-----------------	----------------------	------------------	-----------------

◆ Control Condition

NIRS (5 min)	Rest (20 min)	NIRS (5 min)
-----------------	------------------	-----------------

中等度の運動(40% of VO2max)を
エルゴメータで10分間行う

ワーキングメモリーを測るスタンバークテスト

Working memory task

Subjects were required to remember the sample digits and to indicate whether the probe was contained in them.

2 test blocks were sandwiched by 3 base blocks.

Base (50s)	Test (50s)	Base (50s)	Test (50s)	Base (50s)
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

結果2: ワーキングメモリーの変化

Results: behavioral performance of WM task

Exercise significantly reduced RT compared with control condition.
The exercise facilitation effect was only found in test block.

結果3: NIRS反応の変化

Exercise enhanced Δoxy-Hb level compared with control condition.
The exercise effect was only found in the left hemisphere (LH).

対象と方法

対象: 心理テストSDSもしくはBDI-2にてうつ傾向を示す中年女性(年齢 45 ± 4 歳)7例

運動: 予測最大酸素摂取量50%以下の運動を自転車エルゴメータで10分間実施

心理テスト: 運動前後で心理テスト(POMS)

NIRSによる脳機能研究 (4)

運動療法のリラクゼーション効果

心理テスト POMS Profile of Mood States 気分の状態

- T-A (Tension-Anxiety): 緊張および不安感
- D (Depression-Dejection): 自信喪失感を伴った抑うつ感
- A-H (Anger-Hostility): 敵意と怒り
- V (Vigor): 元気さ躍動感ないし活力
- F (Fatigue): 意欲や活力の低下・疲労感
- C (Confusion): 思考力低下・当惑

POMS

方法

対象
正常成人12例(男性8例、女性4例、23.5 ± 3.7歳)

ワーキングメモリー課題: N-back test (2-back test)

ガム咀嚼によるワーキングメモリーの変化

結果1: ワーキングメモリーに対する効果

結果2: 前頭前野の活動

咬合不全の認知機能に対する長期的影響

55~88歳の男女 11,140人を5年間追跡調査。
 歯を失っている人は、失っていない人よりも認知症に罹患したり、認知機能が低下するリスクが高い。
 (G.-D. Batty, et al. European Psychiatry 2011)

NIRSによる脳機能研究 (4)

咬合不全のワーキングメモリーに対する影響

実験方法

スプリントによる人工的咬合不全

実験プロトコール

(Adv Exp Med Biol. 2013;765:239-44)

咬合不全の不安度に対する影響

(Adv Exp Med Biol. 2013;765:239-44)

交互不全の前頭前野に対する影響

(Adv Exp Med Biol. 2013;765:239-44)

咬合不全のワーキングメモリー (反応時間) に対する影響

(Adv Exp Med Biol. 2013;765:239-44)

咬合不全のワーキングメモリー課題中の前頭前野の神経活動に対する影響

(Adv Exp Med Biol. 2013;765:239-44)

今後の研究開発プロジェクト

Active agingを支援するバイオメディカル工学の研究拠点
-福島県の震災復興に貢献する医工連携研究-

平成26年度私立大学戦略的研究
基盤形成事業
(平成26~30年)

アクティブエイジング (Active aging)

国際保健機関 (WHO) の定義
 • “Active ageing is the process of optimizing opportunities for health, participation and security in order to enhance quality of life as people age.”
 • 「生活の質を低下させることなく、社会参加を続けながら、年を重ねていく」

欧州連合 (EU) :
 2012年を「アクティブエイジングと世代間の連帯のための年」と定めた。

若者が高齢者を支えるという従来の社会通念から脱し、**老若共に支え合う社会**へのパラダイム転換を目指すもの。

高齢者の社会参加を阻害する主な疾患

Life in the 21st Century: A vision for All (World Health Report), Geneva: WHO

郡山市と連携

健康管理システム(評価)

健康の維持増進

鍼灸によるうつ病の治療効果

鍼灸の治療効果

Fukushima式健康予防システムの展開